



**AEDES
NA MIRA**
ENFRENTANDO AS ARBOVIROSES

Guia rápido de agentes de saúde para COVID-19



INTRODUÇÃO

Frente à situação ocasionada pela COVID-19, é necessário que os profissionais de saúde atuando de maneira mais próxima da população adequem sua atuação para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus.

Como parte do Projeto Aedes na Mira, o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e a ProEpi (Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo) elaboraram este guia rápido baseado na nota informativa nº 8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS e nas Recomendações da SAPS/MS para adequação das ações dos Agentes Comunitários de Saúde frente à atual situação epidemiológica de COVID-19.

PLANEJANDO A VISITA

- 👉 Caso esteja apresentando qualquer sintoma respiratório ou febre, permaneça em isolamento de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

Atenção aos sintomas respiratórios



Tosse



Coriza



Dor de garganta



Falta de ar

- 👉 Priorize o bloqueio da transmissão em áreas com intensa circulação de arbovírus (dengue, chikungunya e/ou Zika), adotando medidas depois da análise de indicadores epidemiológicos na última quinzena.
- 👉 Comece removendo os focos larvários. A aplicação de inseticida (UBV) precisa ser avaliada.
- 👉 Mantenha as atividades de controle vetorial nos pontos estratégicos e imóveis especiais, conforme preconizado.
- 👉 Atividades que possam ser adiadas devem ser interrompidas durante a emergência do novo coronavírus.

INICIANDO A VISITA

- 👉 Se o responsável pelo imóvel no ato da visita tiver mais de 60 anos de idade, não realize a visita.
- 👉 Se identificar moradores da casa que estiver visitando com qualquer sintoma respiratório ou febre, notifique o responsável pela COVID-19 e oriente os moradores de acordo com as diretrizes definidas no seu município.
- 👉 Uso de máscara, conforme orientação do seu município.



DURANTE A VISITA

- 👉 Limite sua visita à frente e lados do domicílio, fundo do quintal ou terreno (área peridomiciliar). Não realize atividades no intradomicílio.

Peridomiciliar

Peridomicílio é definido como a área externa de uma residência, em um raio não superior a cem metros. Restrinja sua visita a este local.

Intradomicílio

Intradomicílio é definido como a parte interior da residência. Durante a emergência de COVID-19 não visite essa parte da casa.

- ✎ Mantenha uma distância mínima de 2 metros dos moradores durante a visita.
- ✎ Respeitando uma distância mínima de 2 metros ou através do interfone, estimule a população a remover criadouros de *Aedes aegypti*, bem como adotar outras medidas de prevenção e controle de doenças.
- ✎ Sempre que precisar tratar o criadouro, utilize luvas de látex.
- ✎ Não compartilhe copos, talheres, toalhas e outros utensílios. Utilize os seus próprios.



DEPOIS DA VISITA

- ✎ Ao sair, descarte as luvas em local apropriado e lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Caso não tenha acesso a água e sabão no momento, utilize desinfetante à base de álcool 70%.



Trate o criadouro



Descarte as Luvas




Higienize as mãos

- 👉 Caso utilize uma Unidade Básica de Saúde (UBS) como ponto de apoio, evite usar a área interna dela.

SOBRE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA

- 👉 Avalie a possibilidade de adiar a campanha de vacinação contra raiva para uma data posterior à emergência de COVID-19.
- 👉 Caso seja imprescindível realizar a campanha, prefira uma estratégia de vacinação casa a casa ou, ao menos, evite aglomerar a população.
- 👉 Durante a vacinação, evite contato físico com o tutor do animal.
- 👉 Assim como no caso das visitas domiciliares, não reaproveite luvas e sempre higienize as mãos com água e sabão ou desinfetante com base de álcool 70%.



O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER

- 👉 Em situações de epidemia, o cenário e as orientações técnicas mudam constantemente e, portanto, os processos de trabalho precisam ser reavaliados de maneira periódica.



AEDES NA MIRA

ENFRENTANDO AS ARBOVIROSES

 **CONASEMS**  **ProEpi**